

Weitere Ergebnisse zu kumulativen Konzeptionsraten nach dem Stopp der Einnahme kombinierter oraler Kontrazeptiva aus retrospektiven Untersuchungen zeigt **Abbildung 34**.^{46; 106; 148; 149; 203}




Abbildung 34 Kumulative Konzeptionsraten nach Absetzen oraler Kontrazeptiva aus retrospektiven Untersuchungen.

Betrachtet über den Zeitraum von 6–12 Monaten ist die Fertilität der Frauen nicht eingeschränkt. Diskutiert wird ein gewisser Verzug in der Konzeption von drei Monaten.³⁸¹

Gute Daten zu der Frage, wie sich der Zyklus nach Absetzen oraler Kontrazeptiva verhält, gibt eine Publikation des Programms zur natürlichen Familienplanung unter der Führung von Prof. Freundl.¹²⁷ **Abbildung 35** macht deutlich, dass die Zyklen nach dem Absetzen etwas länger sind als bei Frauen, die keine oralen Kontrazeptiva genommen haben. Erst nach 18 Monaten hat sich der Unterschied komplett nivelliert.




Abbildung 35 Zykluslängen nach Absetzen oraler Kontrazeptiva (175 Frauen mit 3.048 Zyklen) im Vergleich zu Kontrollpersonen (284 Frauen mit 6.251 Zyklen). Daten aus einem Programm zur natürlichen Familienplanung. Nach:¹²⁷